

# Uveitis Screening

Patient:

Patientenetikett

Diagnose Patient Erkrankungsbeginn JIA: ____/____				Informationen zur Erkrankung (Leitlinie: JIA-assoziierte Uveitis, 2017)		
	JIA-Kategorie	ANA positiv	HLA-B27 positiv	Uveitis-häufigkeit	Uveitis-Symptomatik	Labor
<input type="radio"/>	Oligoarthritis persistierend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15–20 %	asymptomatisch	ANA 60–70 %
<input type="radio"/>	Oligoarthritis erweitert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	20–40 %	asymptomatisch	ANA 60–80 %
<input type="radio"/>	RF <sup>-</sup> -negative Polyarthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5–10 %	asymptomatisch	ANA 50–60 %
<input type="radio"/>	Psoriasis-Arthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Beginn JIA Kleinkindalter: bis 20 %	asymptomatisch	ANA 40–50 %
<input type="radio"/>	Psoriasis-Arthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Beginn JIA Schulalter: 10 %	asymptomatisch/ symptomatisch	HLA-B27 20–30 %
<input type="radio"/>	Enthesitis-assoziierte Arthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 %	symptomatisch	HLA-B27 60–70 %
<input type="radio"/>	RF <sup>+</sup> -positive Polyarthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr selten	∅	RF positiv
<input type="radio"/>	Systemische Arthritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	sehr selten	∅	BSG, CRP↑

\*RF-Rheumafaktor

# Empfohlene Uveitis-Screeningintervalle für Kinder und Jugendliche mit JIA ohne bereits diagnostizierte Uveitis

(Leitlinie: JIA-assoziierte Uveitis, 2017)

JIA-Kategorie	ANA	Erkrankungs- alter (in Jahren)	Krankheits- dauer (in Jahren)	Empfohlene Frequenz von Spaltlampen- untersuchungen (in Monaten)	
Oligoarthritis RF-negative Polyarthritis Psoriasisarthritis unklassifizierte Arthritis	+	≤ 6	≤ 4	3 <sup>#</sup>	○
	+	≤ 6	> 4	6	○
	+	≤ 6	≥ 7	12	○
	+	> 6	≤ 2	6	○
	+	> 6	> 2	12	○
Oligoarthritis RF-negative Polyarthritis Psoriasisarthritis unklassifizierte Arthritis	-	≤ 6	≤ 4	6	○
	-	≤ 6	> 4	12	○
	-	> 6	n.r.	12	○
Enthesitis-assoziierte Arthritis	n.r.	n.r.	n.r.	12	○
RF-positive Polyarthritis systemische Arthritis	n.r.	n.r.	n.r.	12	○

n.r. = nicht relevant;

# = aus klinischer Erfahrung können 6-wöchentliche Intervalle im ersten Jahr vorteilhaft sein, entsprechende Studien fehlen bislang.

**Kontakt bei Rückfragen:**



**GKJR**  
Gesellschaft für  
Kinder- und Jugend-  
rheumatologie



**DOG**  
Deutsche Ophthalmologische  
Gesellschaft

Gesellschaft  
für Augenheilkunde

Stand September 2017

Herausgeber: Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie  
und Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, Sektion Uveitis